

VARIABILIS, var. OBTUSA Engelm. (*S. obtusa* Willd.). Je vous prie, Monsieur le Président, d'avoir la bonté de le faire connaître à la Société.

Mais ma tâche n'est pas terminée, et je vais, au plus tôt qu'il me sera possible, m'occuper de rédiger une description complète et comparative (sauf pour les fruits qui ne mûrissent pas ici) de cette belle plante; et je soumettrai cette description aux botanistes avec l'historique de la découverte.

Agréez, etc.

M. Chatin annonce qu'il a trouvé, le 13 de ce mois, aux Planets près Saint-Léger (Seine-et-Oise) le *Splachnum ampullaceum* (que M. Decaisne y avait déjà recueilli il y a une trentaine d'années), ainsi que le *Sphagnum rigidum* var. *compactum*.

M. de Schoenefeld rappelle que le *Splachnum ampullaceum* a été aussi recueilli, à cette même localité, par MM. G. Thuret et Éd. Bornet, en juin 1852.

M. Roze ajoute que Vaillant avait déjà signalé la présence de cette Mousse à Saint-Léger; elle est figurée sur la planche xxvi du *Botanicon parisiense* de cet auteur.

M. Chatin annonce que M. Morière a trouvé dans le parc de Lasson près Creully (Calvados), le *Smyrniium perfoliatum*. Jusqu'ici cette Ombellifère n'était connue en France que dans le département du Var (1).

M. T. Puel fait à la Société la communication suivante :

REVUE CRITIQUE DE LA FLORE DU DÉPARTEMENT DU LOT, par M. T. PUEL (suite).

### HERBIER DU LOT. — Fascicule II.

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 21. <i>Arenaria grandiflora</i> L.       | 31. <i>Crupina vulgaris</i> Cass.  |
| 22. <i>Linum gallicum</i> L.             | 32. <i>Jasminum fruticans</i> L.   |
| 23. — <i>angustifolium</i> Huds.         | 33. <i>Euphrasia lutea</i> L.      |
| 24. <i>Althæa cannabina</i> L.           | 34. <i>Satureia hortensis</i> L.   |
| 25. <i>Ruta graveolens</i> L.            | 35. <i>Salvia officinalis</i> L.   |
| 26. <i>Rhamnus Alaternus</i> L.          | 36. <i>Plantago Cynops</i> L.      |
| 27. <i>Rhus Coriaria</i> L.              | 37. <i>Chenopodium Botrys</i> L.   |
| 28. <i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill. | 38. <i>Gladiolus segetum</i> Gawl. |
| 29. <i>Argyrolobium Linnæanum</i> Walp.  | 39. <i>Ophrys Scolopax</i> Cav.    |
| 30. <i>Artemisia camphorata</i> Vill.    | 40. <i>Phleum asperum</i> Vill.    |

La plupart des espèces qui composent ce fascicule sont d'origine méditerranéenne : je les ai groupées à dessein, afin d'éviter des répétitions

(1) Voyez le Bulletin, t. V, p. 621.

trop fréquentes des mêmes considérations de géographie botanique. Il me suffira ainsi d'examiner, pour chacune de ces plantes en particulier, sa distribution géographique en dehors du bassin du Rhône, et spécialement ses extrémités de végétation, soit dans le bassin de la Gironde, soit au nord de ce bassin.

(*La suite prochainement.*)

M. Garousse met sous les yeux de la Société une Conferve desséchée; c'est le *Conferva glomerata* L. (*Chantransia glomerata* DC.).

M. le Président déclare close la session ordinaire de 1861-62. La Société se réunira de nouveau le 14 novembre prochain.

Conformément au paragraphe 2 de l'art. 41 du règlement, le procès-verbal ci-dessus a été soumis le 30 octobre au Conseil d'administration, qui en a approuvé la rédaction.

---